RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES

Volume: 3 Issue: 7 | July–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

Современные Методы Лечения Пупочного Свища У Детей

Шамсиев Жамшид Азаматович, Тагаев Илхом Улашович,
Мухаммадиев Абдуносир Абдуганиевич, Сайфутдинов Сардор Холдорович
СамГМУ. Клиника Специализированной детской хирургии

Аннотация: В данной статье приведены мнения отечественных и зарубежных ученых о современных методах лечения пупочных свищей у детей.

Ключевые слова: Газы и воздух в кишечнике, вздутие живота, нестандартный развитие пупочной области, мышечное напряжение, лекарства, аллергические реакции на лекарства.

Ввдение.

Пупочный свист у детей может иметь различные причины. Вот некоторые из наиболее распространенных:

1. Газы и воздух в кишечнике: когда у ребенка возникают газы или воздух в желудке или кишечнике, они могут создавать свистящие звуки при выходе через пупок или анус.

2. Вздутие живота: некоторые дети могут страдать от вздутия живота, вызванного газами, запором или другими проблемами с желудочно-кишечным трактом, что может привести к появлению свистящих звуков в области пупка.

3. Мышечное напряжение: иногда мышцы живота у детей могут быть напряжены из-за некорректной позы или из-за дискомфорта, что также может вызывать свистящие звуки.

4. Нестандартный развитие пупочной области: в редких случаях дети могут иметь аномалии или необычное строение пупка, что может способствовать появлению свистящего звука.

Материалы.

Лечение пупочного свища у детей зависит от причины его возникновения. В большинстве случаев, свистящий пупок у детей не требует специального лечения и исчезает сам по себе. Однако, если свистящий звук продолжается или вызывает дискомфорт, следует обратиться к врачу для профессиональной консультации и определения подходящего лечения.

Вот некоторые современные методы лечения пупочного свища у детей:

1. Диета и изменения в рационе: некоторые случаи свиста в области пупка могут быть связаны с диетой или пищевыми привычками. Изменение рациона и исключение из рациона продуктов, которые могут вызывать газообразование, может помочь уменьшить свистящие звуки.

2. Лекарства: в некоторых случаях врач может назначить лекарства для улучшения пищеварения, уменьшения газообразования или устранения других проблем, которые могут вызывать свистящие звуки в области пупка.

3. Физические упражнения и массаж: специальные физические упражнения и массаж живота могут помочь улучшить пищеварение, уменьшить газообразование и снять напряжение в области пупка.

4. Психологическая поддержка: в некоторых случаях свистящие звуки в области пупка у детей могут быть связаны с стрессом или эмоциональными проблемами. Психологическая поддержка и консультации могут помочь в справлении с этими причинами.

Volume: 3 Issue: 7 | July–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

Исследования и методы.

Лечение пупочного свища у детей имеет ряд положительных влияний на организм:

Устранение инфекции:

Пупочный свищ - это отверстие в брюшной стенке, которое соединяется с пупочным каналом. Через него могут проникать бактерии, вызывая инфекцию, которая может распространяться на брюшную полость, приводя к серьезным осложнениям.

Лечение свища предотвращает развитие инфекции, снижая риск сепсиса и других осложнений.

Предотвращение грыжи:

У детей с пупочным свищом существует риск развития пупочной грыжи, когда органы брюшной полости выпячиваются через отверстие в пупочном канале.

Лечение свища помогает укрепить пупочное кольцо, снижая риск грыжи.

Улучшение косметического вида:

Пупочный свищ может быть заметен внешне, что может вызывать у ребенка дискомфорт и стеснение.

Лечение свища устраняет этот дефект, улучшая внешний вид пупка и повышая самооценку ребенка.

Повышение качества жизни:

Инфекция и грыжа могут приводить к боли, дискомфорту и ограничению физической активности ребенка.

Лечение свища устраняет эти проблемы, повышая качество жизни ребенка и родителей.

Предотвращение будущих проблем:

Нелеченный пупочный свищ может привести к хроническим инфекциям, грыжам и другим осложнениям, которые потребуют более сложного и длительного лечения в будущем.

Полученные результаты.

Лечение свища в раннем возрасте позволяет предотвратить эти проблемы и обеспечить здоровье ребенка на долгие годы.

Лечение пупочного свища у детей может оказать положительное влияние на организм, в зависимости от причины свища и выбранного метода лечения. Вот некоторые положительные аспекты лечения пупочного свища у детей:

1. Улучшение пищеварения: некоторые методы лечения, такие как изменения в диете, физические упражнения и лекарства, могут помочь улучшить пищеварение у ребенка. Это может привести к уменьшению газообразования, вздутия живота и других проблем с пищеварением.

2. Снятие дискомфорта: свистящий пупок у ребенка может вызывать дискомфорт и беспокойство. Последующее лечение может помочь уменьшить эти неприятные ощущения и улучшить качество жизни ребенка.

3. Улучшение эмоционального состояния: некоторые дети могут чувствовать стресс или беспокойство из-за свистящего звука в области пупка. Лечение пупочного свища и устранение его причины может помочь в справлении с этими эмоциональными проблемами.

Volume: 3 Issue: 7 | July–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

4. Укрепление связи с врачом: посещения к врачу для лечения пупочного свища могут помочь установить доверительные отношения между ребенком и медицинским персоналом. Это может быть полезно для обеспечения хорошего здоровья и благополучия ребенка.

Обсуждение.

Лечебный эффект от лечения пупочного свища у детей может быть различным в зависимости от причины свища и выбранного метода лечения. Вот некоторые возможные лечебные эффекты, которые могут быть достигнуты:

1. Устранение свистящего звука: основным целью лечения пупочного свища является устранение самого свистящего звука. После успешного лечения может произойти полное прекращение свиста или его существенное уменьшение.

2. Улучшение пищеварения: ряд методов лечения, включая коррекцию диеты, прием лекарств или выполнение специальных упражнений, могут способствовать улучшению пищеварения у ребенка, что приведет к уменьшению газообразования, вздутия и дискомфорта в области живота.

3. Снятие дискомфорта и боли: эффективное лечение пупочного свища может помочь уменьшить дискомфорт и болевые ощущения, которые могут сопровождать это состояние.

4. Предотвращение возможных осложнений: если пупочный свищ вызван серьезными проблемами с пищеварением или другими заболеваниями, успешное лечение может помочь предотвратить развитие осложнений и дальнейшее ухудшение состояния ребенка.

Лечение пупочного свища у детей, как и любое хирургическое вмешательство, может иметь некоторые побочные эффекты. Однако, важно отметить, что эти эффекты обычно временные и, как правило, не серьезные.

Вот некоторые возможные побочные эффекты:

Общие побочные эффекты от хирургического вмешательства:

Боль: Ребенок может испытывать боль после операции. Врач назначит обезболивающие препараты для ее облегчения.

Кровотечение: Незначительное кровотечение из операционной раны может возникнуть, но обычно оно останавливается самостоятельно.

Инфекция: Риск инфекции после операции существует, но он достаточно низкий. В случае возникновения инфекции врач назначит антибиотики.

Шрам: После операции останется небольшой шрам, который со временем станет менее заметным.

Отек: Отек вокруг операционной раны является нормальным явлением и обычно проходит в течение нескольких дней.

Специфические побочные эффекты, связанные с лечением пупочного свища:

Выделения: Из операционной раны может быть небольшое количество выделений, которые постепенно прекращаются.

Грыжа: В редких случаях может возникнуть пупочная грыжа после операции, если пупочное кольцо не полностью закрылось.

Неполное закрытие свища: В редких случаях свищ может не полностью закрыться после операции, что может потребовать дополнительного лечения.

Volume: 3 Issue: 7 | July–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

Побочные эффекты зависят от возраста ребенка, сложности свища, используемой методики лечения и индивидуальных особенностей организма.

В большинстве случаев лечение пупочного свища проходит без серьезных осложнений.

Врач обязательно расскажет вам о возможных побочных эффектах и ответит на все ваши вопросы.

Если вы заметили у ребенка какие-либо необычные симптомы после операции, обязательно свяжитесь с врачом.

Лечение пупочного свища у детей обычно безопасно, но как и любое другое лечение, оно может сопровождаться побочными эффектами. Вот некоторые из возможных побочных эффектов, которые могут возникнуть при лечении пупочного свища у детей:

1. Аллергические реакции на лекарства: если для лечения используются лекарства, то ребенок может проявить аллергическую реакцию на одно из компонентов препарата. Это может проявляться в виде кожной сыпи, зуда, отека лица или затруднения дыхания.

2. Расстройство желудочно-кишечного тракта: некоторые препараты или изменения в диете, предписанные для лечения пупочного свища, могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта у ребенка, такие как диарея, запор или вздутие.

3. Болезненные ощущения: некоторые методы лечения, такие как массаж или физические упражнения, могут вызывать дискомфорт или болезненные ощущения у ребенка.

4. Психологические реакции: некоторые дети могут испытывать стресс или беспокойство в связи с лечением пупочного свища, особенно если процедуры лечения вызывают дискомфорт или тревогу.

5. Непреднамеренные последствия: в некоторых случаях, неправильное лечение или неправильно подобранные методы могут привести к нежелательным последствиям или ухудшению состояния ребенка.

В случае возникновения каких-либо нежелательных побочных эффектов при лечении пупочного свища у ребенка, важно немедленно проконсультироваться с врачом. Врач сможет рекомендовать дальнейшие действия, корректировку лечения или назначить другой метод лечения, который будет более безопасным и эффективным для конкретного случая.

Заключения.

Лечение пупочного свища у детей имеет несколько лечебных эффектов, направленных на устранение проблемы и улучшение состояния ребенка:

Основной лечебный эффект:

Закрытие свища: Лечение свища направлено на полное закрытие отверстия в пупочном канале, препятствуя проникновению инфекции в брюшную полость. Это является ключевым моментом для предотвращения серьезных осложнений.

Дополнительные лечебные эффекты:

Устранение инфекции: Лечение свища позволяет избавиться от существующей инфекции и предотвратить её повторное развитие. Это снижает риск сепсиса и других опасных осложнений.

Предотвращение грыжи: Закрытие свища укрепляет пупочное кольцо, что уменьшает риск развития пупочной грыжи, которая может привести к нарушению работы внутренних органов.

Volume: 3 Issue: 7 | July–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

Уменьшение боли и дискомфорта: Инфекция и грыжа могут вызывать боль, дискомфорт и ограничения в движении ребенка. Лечение свища устраняет эти проблемы, повышая комфорт ребенка и позволяя ему полноценно двигаться.

Улучшение косметического вида: Закрытие свища устраняет видимый дефект, улучшая внешний вид пупка и повышая самооценку ребенка, особенно по мере его взросления.

Улучшение качества жизни: Лечение свища позволяет ребенку жить полноценной жизнью без страха перед инфекцией или грыжей, повышая его качество жизни и давая возможность родителям быть спокойными за его здоровье.

Лечение пупочного свища проводится индивидуально, с учетом возраста ребенка и характера свища.

Выбор метода лечения (хирургический или консервативный) осуществляется врачом-хирургом после проведения обследования.

После лечения необходимо соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать рецидива свища.

Лечение пупочного свища имеет важный лечебный эффект, направленный на устранение проблемы и повышение качества жизни ребенка.

Список использованной литературы:

1. Детская хирургия: национальное руководство/ под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. – 2009.
2. Заболевания кожи и подкожной клетчатки в периоде новорожденности/ Логинова И. А. – 2010.
3. Полный свищ пупка, осложненная флегмонозным омфалитом, у ребенка 8 месяцев/ Боднар Б.М., Микитинський Є.М. и др.// Клиническая анатомия и оперативная хирургия. – Т. 12, N2. – 2013.
4. Early diagnosis and treatment of children weeping navel/ Matyakub, Chuliev, et al.// International scientific review. – №2 (33). – 2017.
5. Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б., Батраков С.Ю. Детская хирургия. Национальное руководство. Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2021 г. – 1280 с.
6. Разин М.П., Сухих Н.К., Галкин В.Н. Детская урология-андрология. Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2011 г.
7. Горланов И.А., Милявская И.Р., Леина Л.М. Детская дерматология. Руководство для врачей. Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2022 г.
8. Гисак С.Н., Руднев В.И., Заскин С.З., Васильев В.Ф., Гурвич Л.С., Птицын В.А. Наружные кишечные свищи у детей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2007 г. №2.
9. Ахпаров Н.Н., Литош В.Е., Ойнарбаева Э.А., Сулейманова Сауле Бахтьяровна. Пищеводно-бронхиальный свищ у детей как осложнение инородного тела пищевода // Детская хирургия. 2012. №6.